



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека



✚ при планировании ребенка или при наступлении беременности нужно как можно раньше обратиться в медицинской учреждение для обследования, т.к. в случае если женщина ВИЧ - положительна необходимо, получить профилактическое лечение антиретровирусными препаратами во время беременности и родов, также лечить новорожденного ребенка, исключив грудное вскармливание.

В начале заболевания человек не ощущает никаких признаков болезни. Поэтому если вы когда либо употребляли наркотики, имели незащищенный секс, если вам небезразлично ваше здоровье и здоровье близких, то необходимо пройти тестирование на ВИЧ. Для граждан Российской Федерации оно проводится бесплатно, конфиденциально (о результате будете знать только вы и лечащий врач).

У многих людей антитела к ВИЧ вырабатываются в течение 28 дней, поэтому на ранней стадии инфекции (это период серонегативного окна) антитела не выявляются. Поэтому при отрицательном результате необходимо сдавать анализ крови на ВИЧ через 3-6 месяцев после рискованного контакта.

Вовремя диагностируемое заболевание и эффективное лечение позволяет ВИЧ-инфицированным жить долгой и полноценной жизнью.

Информация о тестировании на ВИЧ инфекцию и о пораженности ВИЧ инфекцией населения республики находится на официальном сайте Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» <http://www.ufaids.bashmed.ru/>

К Международному Всемирному дню борьбы со СПИДом



02.fbuz



vk.com/sesufa

sesufa.ru

К Международному Всемирному дню борьбы со СПИДом

1 декабря отмечается **Всемирный день борьбы со СПИДом** (Синдром приобретенного иммунодефицита). Целью этого дня является привлечение внимания общества к этой проблеме, распространение информации о ВИЧ, повышение уровня информированности граждан в вопросах профилактики инфекции.

ВИЧ-инфекция - инфекционное хроническое заболевание, вызывается вирусом иммунодефицита человека, приводящее к медленному разрушению иммунной системы.

СПИД наступает, когда иммунная система практически разрушена, развиваются разнообразные инфекционные заболевания, такие как: туберкулез, герпес, пневмония, кишечные или грибковые инфекции и иногда слабый иммунитет может стать причиной вторичных злокачественных новообразований.

Источник ВИЧ-инфекции – больные ВИЧ на любой стадии заболевания, в том числе в инкубационном периоде.

Инкубационный период - это период от момента заражения до появления клинических симптомов, обычно составляет 3 месяца, но на фоне лечения при иммунодефиците у пациента может увеличиваться до 1 года.

Инфицирование может произойти при контакте с биологическими жидкостями других людей: кровь, компоненты крови, сперма, вагинальное отделяемое, грудное молоко.

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ: при укусах насекомых, при посещении бассейна или бани, при пользовании общей посудой и туалетом, при совместном обучении, играх, уходе за больным, при повседневных контактах, таких как поцелуи, объятия, рукопожатия.

Клиника

Острая стадия сопровождается лихорадкой, лимфаденопатией, неспецифическими (пятнисто-папулезными, уртикарными, петехиальными) высыпаниями на коже и слизистых, болями в мышцах и суставах, диареей, головной болью, тошнотой и рвотой, увеличением печени и селезенки и менингеальным синдромом.

Субклиническая стадия длится в среднем около 5-7 лет (от 1 до 8 лет, иногда более), клинические проявления кроме увеличения лимфатических узлов отсутствуют.

Стадия вторичных заболеваний. Нарастает иммунодефицит и появляются различные инфекционные (вирусной, бактериальной, грибковой природы) и онкологические заболевания.

Профилактика

- ✚ не употреблять инъекционные наркотические вещества
- ✚ пользоваться только одноразовым и стерильным инструментарием для инъекций, других медицинских манипуляций, нанесения татуировок, пирсинга.
- ✚ избегать случайных половых связей, использовать барьерные средства контрацепции (презервативы).
- ✚ применять антиретровирусную терапию в профилактических целях после возможного заражения.
- ✚ проходить тестирование и лечение инфекций, передаваемых половым путем, включая ВИЧ, для предотвращения дальнейшей передачи.
- ✚ проводить профилактику, в случае, если подверглись заражению ВИЧ-инфекции, в связи с профессиональной деятельностью, так и в других ситуациях.



02.fbuz



vk.com/sesufa

sesufa.ru



02.fbuz



vk.com/sesufa

sesufa.ru